




Zeist - Bunnik

DOEL

De verkenning voor het deelgebied Zeist-Bunnik geeft een concrete invulling aan het functioneren van het gebied als ecologische schakel tussen het Noorderpark en het Langbroekerwetering gebied. Uitwisseling van soorten tussen deze twee gebieden moet plaatsvinden via deze landgoederenzone waar weliswaar veel EHS natuur (bestaande natuur en nieuwe natuur) aanwezig is, maar die ook is ingeklemd tussen de bebouwing van verschillende kernen en wordt doorsneden door infrastructuur. Daarnaast wordt in de verkenning ook de uitwisseling met de Utrechtse Heuvelrug beschouwd.

Het deelgebied dient primair als ecologische schakel voor aan land gebonden soorten en heeft in die zin een functie als droge verbinding waarbij in doorgaande natte structuren ook aan water gebonden soorten kunnen meeliften.

De verkenning betreft een ruimtelijke uitwerking en een beschrijving in termen van soorten en biotopen. In het inrichtingsbeeld dat als product van de verkenning is gemaakt, is het beleid concreet gemaakt hetgeen de verschillende gebiedspartijen concrete handvaten biedt om met de realisatie van het deelgebied Zeist-Bunnik aan de slag te gaan.



UITWERKING EHS 2010



Landgoed Wulperhorst

Landgoederen vormen in de omgeving van Zeist en Bunnik belangrijke ecologische kerngebieden

(foto boven Renk Ruiter, twee foto's rechts Pieter Joost Lemmens)



DE NATUUR IN DEELGEBIED ZEIST-BUNNIK IN VOGELVLUCHT

De landgoederen vormen de kerngebieden binnen het deelgebied Zeist-Bunnik. Het gaat bijvoorbeeld om de landgoederen Wulperhorst, Niënhof, Rijnwijck en Blikkenburg. De landgoederenzone op de Utrechtse Heuvelrug fungeert eveneens als een kerngebied. De zone landgoed Oostbroek, Vollenhoven II en de Lage grond vormt eveneens één groot kerngebied.

Stapstenen worden gevormd door losse percelen en de kleinere natuurkernen. Het betreft bijvoorbeeld de bos-, hakhout- en graslandpercelen in de agrarische zone tussen de Nieuwe Hakswetering en de Koelaan en de diverse percelen net ten noorden van de A12 (nabij Rijnwijck) en zuiden van de A12 (bij de Raaphof). Daarnaast vormen de watergangen en lanen natte en droge corridors binnen het gebied. Deze lopen parallel aan de middeleeuwse verkavelingsstructuur in het gebied. De Zeister en Biltse Grift en Nieuwe Hakswetering vervullen eveneens een functie als natte corridor.

De lanen in het gebied tussen Zeist en Bunnik hebben een belangrijke functie als migratieroute voor vleermuizen. Daarnaast zijn plaatselijk ontsnipperende voorzieningen noodzakelijk voor het realiseren van een doorgaande ecologische structuur. Poelen vormen een noodzakelijke aanvulling op de ecologische structuur van het gebied en fungeren als stapsteentje en voortplantingsbiotoop voor amfibieën.

De biotopen die in het plangebied aanwezig zijn en die een functie vervullen in de ecologische structuur van het gebied bestaan voornamelijk uit soorten- en bloemrijk grasland, hakhout en bos. Ondersteunende biotopen zijn moeras, boomgaarden, natuurakkers, struweel en begroeid en helder open water.

	Extensief beheerde hooilanden, broek- en moerasbossen en plasjes en sloten met een goed ontwikkelde oevervegetatie	Structuurrijke bosranden, door bos omsloten weilanden en ruigten	Gevarieerd kleinschalig landschap met dekkingbiedende bosjes, houtsingels, ruigtestroken en andere geleidende structuren
0-5 jaar	Das Dwergmuis Waternieuw Nachttegaal Bosrietzanger Ringslang Kamsalamander Poelkikker Grote modderkruiper Kleine Modderkruiper Oranjetipje Glassnijder	Das Ringslang Grasmus Kneu Matkop Oranjetipje	Bunzing Das Gewone grootoorvleermuis Hermelijn Laatvlieger Boomvalk Steenuil Ransuil Grasmus Kneu
5-10 jaar	Heikikker Watersnip Tureluur Patrijs	Roodborsttapuit Argusvlinder Bruin blauwtje Sleedoornpage	Wezel Roodborsttapuit
> 10 jaar	Waterspitsmuis		

Doelsoorten per biotooptype en tijdschad



Reegeit (foto Renk Ruiter)



Biologische akker (foto Renk Ruiter)